

产品名称: 人参皂苷Re

学名: Ginsenoside-Re

CAS编号: 52286-59-6

别名: 人参皂苷 Re ; Ginsenoside Re; Dammarane, b-D-glucopyranoside deriv.; Chikusetsusaponin IVc; Ginsenoside B2; Ginsenoside Re; NSC 308877; Panaxoside Re; Sanchinoside Re

分子式: C₄₈H₈₂O₁₈

分子量: 947.15388

性状: White Powder

化合物种类: 三萜类

来源: 人参 Panax ginseng C.A. Mey

纯度: HPLC ≥ 98%

品牌: pureonebio

规格: 10mg/20mg/50mg/100mg/500mg/1g等, 另可根据需求量包装

详细信息:

HPLC法测定人参须中人参皂苷Rg1、人参皂苷Re及人参皂苷Rb1的含量

目的: 用HPLC对人参须中人参皂苷Rg1、人参皂苷Re及人参皂苷Rb1进行测定。方法: 采用依利C18色谱柱, 流动相: 乙腈(A)-水(B), 梯度洗脱(0~35min, 19%A; 35~55min, 19%A→29%A; 55~70min, 29%A; 70~100min, 29%A→40%A); 流速: 1.0 ml · min⁻¹; 检测波...

西洋参中人参皂苷Rg₁、人参皂苷Re和人参皂苷Rb₁的含量测定

目的: 用快速分离液相色谱法分离测定西洋参中人参皂苷Rg1、人参皂苷Re和人参皂苷Rb1的含量。方法: 采用ZOBAX SB-C18柱(4.6 mm × 50 mm, 1.8 μm), 流动相: 乙腈(A)-0.1%磷酸(B), 梯度洗脱(0~25min, 5%A→20%A; ~35min, 20%A→40%A); 流速: 2.0 mL · min⁻¹, ...

HPLC法测定人参提取物中人参皂苷Re和人参皂苷Rg1的含量

目的: 研究高效液相色谱法测定人参提取物中人参皂苷Re和人参皂苷Rg1。方法: 采用反相高效液相色谱法, KNAUER-C18(250 mm × 4.6 mm, 5 μm)柱, 乙腈:1%磷酸溶液(20:80)为流动相, 流速为1.0 ml · min⁻¹, 检测波长203 nm, 柱温为30℃, 进样量10 μl。结果: 人参皂苷Re和人参皂苷Rg1的平均回收率...

人参茎叶总皂苷中人参皂苷Re的含量分析

目的: 分析人参茎叶总皂苷中人参皂苷Re的含量, 为人参总皂苷的质量控制提供依据。方法: 色谱柱: Diamonsil C18(4.6 mm × 25 mm, 5 μm), 保护柱: DIKMA EasyGuard C18(10 mm × 4.6 mm), 流动相: 乙腈-0.5%冰醋酸水溶液, 梯度洗脱, 流速: 1.25 mL/min; ELS...

总机: 021-50278061

邮箱: info@pureonebio.com

网址: <http://www.pureonebio.com>